

¿Cómo prevenir y controlar?

- Cuarentena de las nuevas aves por al menos 30 días
- Cuando compre aves pídale al vendedor que le provea los certificados de salud o la información de salud de las aves
- Cuarentena de las aves enfermas en cuartos con sistemas de ventilación independiente
- Las aves nuevas deben visitar un veterinario antes de juntarlas con otras aves
- Limpie y desinfecte la jaula previniendo la volatilización de materiales infecciosos mojando la paja antes de limpiar
- No utilizar desinfectantes en los objetos que entran en contacto directo con las aves
- Tirar a la basura los artículos que no se puedan limpiar o dejarlos en las habitaciones designadas para las aves
- Use equipo de protección personal tales como: guantes, gafas, botas, y respiradores con N95 o superior



CLAMIDIA Y LAS AVES

LO QUE NECESITAS SABER



Para obtener más información , póngase en contacto con la Oficina del Veterinario Estatal o visite nuestro sitio web

Veterinario de la Autoridad Estadual

Teléfono: (850) 410-0900

Sin Peaje: 1-877-815-0034

La Presentación de Informes 24-

Horas: 1-800-342-5869

www.FreshFromFlorida.com/ai

Departamento de Agriculture y Servicios
al Consumidor de Florida
División Pecuaria
407 South Calhoun Street
Tallahassee, FL 32399

<http://www.cdc.gov/pneumonia/atypical/psittacosis>

<http://www.nasphv.org/documentsCompendiaPsittacosis>



**Florida Department of
Agriculture and Consumer Services**

Clamidia Y Las Aves

¿Qué es la Psitacosis / Chlamydiosis / Ornitosi / Fiebre del loro?

- La Chlamydiosis es una enfermedad de las aves causada por la bacteria *Chlamydia psittaci*
- Se refiere a Psitacosis cuando se infectan los seres humanos
- Es una enfermedad zoonótica lo que significa que se puede transmitir de los animales a los humanos
- La Chlamydiosis es altamente contagiosa y no se genera inmunidad
- Todas las aves están en riesgo, pero algunas son más susceptibles como las amazonas, guacamayos, cakatúas, agapornis y los periquitos

¿Cómo se transmite?

- Los pájaros normalmente contienen esta bacteria
- Ellos se pueden enfermar al encontrarse en condiciones de estrés causando que la bacteria se active
- Condiciones de estrés pueden ser asociadas a una reciente reubicación, condiciones de hacinamiento, transporte, las instalaciones de cría o ambientes inestables
- La bacteria se transmite a través de las heces de los pájaros, secreciones oculares, nasales o respiratorias o con el polvo de las plumas
- Las aves y los seres humanos pueden inhalar material contaminado o ingerir alimentos y agua contaminada
- Los seres humanos corren el riesgo de contaminación accidental durante la limpieza de jaulas, no lavarse las manos o durante el tratamiento y/o manejo de aves infectadas.

Qué buscar... los signos y síntomas

Los signos de la enfermedad en las aves pueden presentarse como aguda o crónica

- Signos agudos
 - Dificultad para respirar
 - Secreción nasal
 - Secreción ocular
 - Inflamación o irritación de los ojos
 - Pérdida del apetito
 - Pérdida de energía
 - Pelos erizados
 - Micción excesiva
 - Diarrea
- Signos crónicos
 - Neumonía
 - Temblores
 - Convulsiones
 - Parálisis de la pierna(s)
 - Depresión
 - Posicionamiento irregular de la cabeza
 - Flexión de cuello

Algunas aves no muestran signos de enfermedad pero aun así transmiten la bacteria

- Los síntomas de la enfermedad en humanos pueden presentarse como síntomas similares a la gripe
 - Letargo
 - Pérdida del apetito
 - Náuseas
 - Dolor de pecho
 - Tos seca
 - Dolores de cabeza
 - No incluye: dolor de garganta, nariz congestionada o mucosidad

¿Y ahora qué?

- Si tiene sospechas de aves enfermas contacte un veterinario inmediatamente
- El diagnóstico depende de la gravedad de las condiciones y del sistema inmunológico de las aves
- Si usted ha tenido contacto con una ave enferma y sospecha que puede haber contraído la enfermedad, debe contactar a su médico

Tratamiento

- Antibióticos por 45 días según lo prescriba el veterinario
- Reducir la dosis, no dar la dosis completa, o suspender el tratamiento puede llevar a la resistencia a los antibióticos, las manifestaciones asintomáticas, o empeoramiento de la condición

